



ABCES PÉRIANAL

MÉDECINS

Dr. L. De Bock
Dr. S. Marcoen
Dr. W. Van Riel
Dr. J. Tieck

SÉCRETARIAT

Tél. 055/23 35 95

INFIRMIÈRE EN CHEF

Ann Bauters
Tél. 055/23 33 36

absl Werken Glorieux | ch Glorieux
Avenue Glorieux 55, B-9600 Ronse
T 055 23 30 11, F 055 23 30 22
www.azglorieux.be, info@azglorieux.be

7/04/2017
CHI05_FR

Cher patient,

Sous anesthésie générale, on vous a drainé un **abcès périanal**.

Lorsque vous quitterez la clinique, veillez à ce que quelqu'un puisse vous reconduire chez vous.

Quoique la douleur soit moindre suite au drainage, vous pourriez probablement prendre des anti-douleurs encore pendant quelques jours (voir prescription jointe).

Aujourd'hui, il serait utile de passer à la pharmacie pour tout le matériel et les médicaments nécessaires pour les soins (voir prescription jointe).

SOINS DU LENDEMAIN

Vous ne pourrez pas réaliser les soins vous-même. Il nous semble donc utile que quelqu'un du service infirmier à domicile (mutuelle ou indépendant privé) passe vous prodiguer les soins.

Le plaie doit être désinfectée tous les jours et rincée à l'isobétadine et un drainage par mèche doit être placé.

Accordez-vous suffisamment de repos (allongé) et pour vous asseoir, vous faites bien de le faire sur un coussin en anneau (disponible dans les mutuelles) ou une bouée de piscine.

Des bains de siège tièdes sont recommandés.

Après 3 jours, un contrôle chez votre médecin traitant est souhaitable.

PRÉSCRIPTION

- Isobétadine derm.
- Dolzam
- Mèches stériles - largeur 2 à 3 cm
- Compresses stériles 10 x 10 cm
- Compresses ouatées 10 x 10 cm
- Micropore 1 rouleau