



TEE Transoesofagaal echocardiogram

CARDIOLOGIE

Dr. L. Vanneste
Dr. A. Heyse
Dr. F. Van Durme
Dr. B. Alzand

SECRETARIAAT INWENDIGE GENEESKUNDE

Tel. 055/23 36 68

AFDELING CARDIOLOGIE

Hoofdverpleegkundige
Frank Van Welden
Tel. 055/23 32 55

Verpleegpost Geneeskunde 2
Tel. 055/23 36 95

Vzw Werken Glorieux I az Glorieux
Glorieuxlaan 55, B-9600 Ronse
T 055 23 30 11, F 055 23 30 22
www.azglorieux.be, info@azglorieux.be

DOEL VAN HET ONDERZOEK

Bij een transoesofagaal echocardiogram gebruikt de arts dezelfde techniek als bij een gewone echografie. Deze uitbreiding van het onderzoek kan nodig zijn om een beter zicht te krijgen op bepaalde (achteraan gelegen) structuren van het hart of bij beperkte beeldkwaliteit bij het gewone onderzoek. Dit onderzoek gebeurt ter uitsluiting van klontervorming bij voorkamer fibrillatie, om de oorzaak van een beroerte op te sporen of bij ernstig hartkleplijden.

Er wordt vanuit de slokdarm en de maag naar het hart gekeken. Hiervoor dient u een slangvormige transducer in te slikken.

Een arts zal altijd op voorhand met u overleggen en het onderzoek zelf uitvoeren.

VOORBEREIDING OP HET ONDERZOEK

Als voorbereiding dient u vóór het onderzoek minstens 4 uur nuchter te zijn. Dit betekent dat u niets mag eten of drinken.

U mag wel uw onderhoudsmedicatie innemen met een slokje water.

Indien u bloedverduunners neemt (bv. Pradaxa®, Eliquis®, Lixiana® en Xarelto®) mogen die niet onderbroken worden en eveneens ingenomen met een klein slokje water.

VERLOOP VAN HET ONDERZOEK

Tijdens het onderzoek vragen wij u om een bijtring in de mond te houden. Dit is nodig om beschadiging van de kostbare transducer te voorkomen. Als u een kunstgebit draagt, moet u dit uitdoen.

Veelal dienen we een licht kalmeermiddel toe en verdoven de keel met een spray. Daarna vragen we u om de transducer in te slikken. Dit kan een kokhalsreflex bij u opwekken, maar dit is een normale reactie.

Zodra de transducer in de slokdarm zit, heeft u over het algemeen geen last meer. U kunt dan ook gewoon ademen. Probeer tussendoor om niet te slikken, want doordat de keel verdoofd is, zou u zich kunnen verslikken.

DUUR VAN HET ONDERZOEK

Het onderzoek duurt ongeveer 8 à 15 minuten.

NA HET ONDERZOEK

Na het onderzoek mag u nog 2 uur niet eten of drinken gezien het risico op verslikken. U merkt zelf wel wanneer de verdoving is uitgewerkt en u terug normaal kunt slikken. Daarna zou u nergens meer last van mogen hebben. Mocht u toch klachten hebben, neemt u best contact op met uw arts of verpleegkundige.

AANDACHT

Als u een kalmeermiddel heeft gekregen, mag u dezelfde dag geen voertuig meer besturen of gevaarlijke activiteiten uitvoeren.

Uw reflexen en beoordelingsvermogen kunnen namelijk verminderd zijn.

TOT SLOT

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u die gerust stellen op de afdeling, voordat het onderzoek begint.

Heeft u nog vragen in verband met de voorbereiding, dan kan u steeds terecht bij uw behandelende arts of verpleegkundige van de dienst.

AFSPRAAK

Datum:

Uur:

Afdeling:

Gelieve op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek.

Als u onverwachts de afspraak niet kunt nakomen, gelieve dan tijdig contact op te nemen met het secretariaat Inwendige Geneeskunde op 055/23 36 68.